

ШТА ЈЕ ГРОЗНИЦА ДОЛИНЕ РИФТА?

Грозница долине Рифта је вирусно обољење животиња и људи (зооноза).

КОЈЕ ЖИВОТИЊЕ НАЈЧЕШЋЕ ОБОЛЕВАЈУ?

Најчешће оболевају овце, козе и говеда, али су угрожени и други преживари. Пси и мачке могу имати пролазну виремију.

ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО КОНТРОЛИСАТИ ГРОЗНИЦУ ДОЛИНЕ РИФТА?


Грозница долине Рифта је зооноза која се преноси векторима – комарцима. Епидемија ове болести може довести до великих економских губитака (услед угинућа, побачаја и др.).

ГЕОГРАФСКА РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ВИРУСА

Грозница долине Рифта присутна је углавном у субсахарским земљама Африке и на Мадагаскару. У Саудијској Арабији и Јемени болест је присутна од 2000. године. До сада у Европи није забележено присуство вируса. Међутим, у неколико европских земаља идентификовани су вектори - преносиоци инфекције, што представља реалну могућност за појаву вируса на Европском континенту.

КАКО СЕ ВИРУС ПРЕНОСИ?

Вирус се преноси инфицираним животињама или векторима. Различите врсте комараца су преносници овог вируса, нарочито током кишних година кад је њихова бројност повећана.



НАЧИН ПРЕНОШЕЊА БОЛЕСТИ СА ЖИВОТИЊА НА ЉУДЕ

ГРОЗНИЦА ДОЛИНЕ РИФТА - РИЗИК ЗА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ

У високо ризичне групе убрајају се држаоци животиња, ветеринари, запослени у клиникама, кожарама, лабораторијама или болницама.

Клинички симптоми су слични онима који се појављују код особа инфицираних вирусом грипа.

Људи се могу заразити путем аеросола, контактом, уједом зараженог комарца, преко сировог меса и млека као и преко телесних течности (крви, вагиналног секрета након побачаја, током клања и др.).

Није познато да се болест преноси са човека на човека.

КОЈИ СУ КЛИНИЧКИ ЗНАЦИ БОЛЕСТИ?

- Код младих животиња јавља се повишена телесна температура, слабост и депресија, губитак апетита, бол у стомаку, дијареја и крвава столица, а може доћи и до наглог угинућа. Болест може брзо напредовати и узроковати висок проценат угинућа младих животиња у стаду;
- Код старијих животиња инфекција је углавном блага или асимптоматска. Од клиничких симптома јављају се: побачаји, повишена температура, губитак апетита, слабост и депресија, повраћање, дијареја и крвара столица, убрзано дисање, појачан секрет из носа и појачано лучење пљувачке. Процент побачаја у зараженим стадима може бити и до 85% код говеда, односно 100% код оваца.



МРТВОРОЂЕНА ЈАГЊАД



АНОРЕКСИЈА И ДЕПРЕСИЈА ОБОЛЕЛЕ ЖИВОТИЊЕ

КАКО СПРЕЧИТИ И КОНТРОЛИСАТИ ВИРУС ГРОЗНИЦЕ ДОЛИНЕ РИФТА?

- Редовном контролом здравља животиња;
- Редовном контролом популације вектора - преносиоца инфекције (комараца), надгледањем њихових станишта и редовном дезинсекцијом;
- Редовном контролом кретања животиња и промета хране и производа животињског порекла.

КОМЕ СЕ ТРЕБА ОБРАТИТИ АКО СЕ ПОСУМЊА НА БОЛЕСТ?

Уколико код животиња постоје промене здравственог стања које могу указивати на ову болест обратите се ветеринару или надлежној ветеринарској инспекцији.



Пројекат „**Јачање система здравља и добробити животиња**“ који финансира Европска унија подржава развој и унапређење пољопривреде у Србији.

Пројекат пружа подршку Управи за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у процесу усклађивања домаћег законодавства са ЕУ и међународним стандардима у области здравља животиња, биосигурносних мера и добробити животиња.



Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорна Управа за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и „Опера“ с.р.л. Италија, и та садржина не изражава званичне ставове Европске Уније.

ШТА ТРЕБА ЗНАТИ О ОВОЈ БОЛЕСТИ?

